

# ACETAZOLAMIDE

## （乙酰唑胺）

---

### 病人须知

此册为您解答一些对于此药物的疑问，并不完全详载此药之全部资料，若有任何疑问，可请教医生或药剂师。

### 此药有什么用途？

Acetazolamide 用于控制癫痫或惊风发作，也可用于神经系统的其他病例。

### 何时服用此药？

- 通常每日口服二至三次。刚开始服药时，医生会用较低的剂量，然后逐步地将剂量增加。请遵守标签上的指示，如有疑问，请向药剂师或医生询问。
- 在未经过医生的同意之前，请勿自行调整剂量或停止服药。突然停止服用此药会导致惊风症状不受控制。
- 若无医生同意，请勿擅自更换药物品牌或剂型。

### 如何服用此药？

将整粒药片与一杯开水吞服。若您孩子无法将整粒药片吞下，可将药片磨成粉，然后把药粉加入少许的食物里（比如：雪糕、乳酸菌饮料或糖浆）让孩子服用。此药可与食物一起服用或空肚服用。

### 忘记或漏服药该怎么办？

- 立即补服药物。若已接近下次服药的时间，不必补服而依照下次服药的时间服药。
- 勿连服两剂或自行增加剂量。
- 若孩子漏服两剂或以上的药物或您不清楚该怎么做，请向您的医生或药剂师询问。
- 若您孩子只剩两星期或更少的药量，请确保您已安排孩子下一次的复诊，或已得药单准备往药房购买药物。

### 此药会引起什么副作用？我该怎么应付这些副作用？

常见的副作用通常会在孩子开始服药期间出现。常见的副作用包括：

- 恶心、呕吐、消化不良、腹痛、腹泻、食欲不振、影响味觉。  
若觉得肠胃不适，药物可与食物一起服用，但勿用汽水服药。

- 头痛、嗜睡、头晕、疲倦、行动不稳。  
若服用其他药物要特别小心， 伤风感冒药可能加重嗜睡的副作用。孩子进行骑轿车或其他类似活动时， 家长必须谨慎督促。
- 视线模糊
- 乏力、肌肉协调欠佳、手脚麻痹
- 行为异常如多动、急躁、思绪混乱。

若以上副作用在几天后仍没有消失， 或影响孩子的日常生活， 请告知医生。

此药可能导致一些罕见但严重的副作用。若出现以下副作用， 请立即通知医生或到急诊部求医：

- 严重皮疹， 皮肤发红、发痒或脱皮
- 视线持续模糊、眼部疼痛。
- 小便困难或疼痛
- 皮肤或眼睛泛黄， 尿液呈深色（黄疸）
- 淤血或不寻常的出血（如：粪便呈深色）， 长期发烧、咳嗽、口疮

若服用药后出现其他不寻常的现象， 请告知医生。若对于孩子服用药物有任何疑问或困难， 请与您的医生交谈或讨论。

## 其他资讯

若小孩有肾结石的家族病史， 请您将此事通知医生。

服用此药时， 孩子必须多喝开水以防肾结石。

若小孩对磺胺(sulphonamide)过敏， 请您通知医生。

在让孩子服用其他药物、补充品或草药前， 请告知医生或药剂师。

若孩子由于任何原因必须向其他医生求诊， 请告知他孩子在服用此药物。

---

若需要更多资讯， 请向医生或药剂师询问。  
儿童脑科部与药剂部合作呈现的医药资讯计划。



Last Review: 01/08/2014

Produced by Department of Pharmacy  
KK Women's and Children's Hospital

**PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®**